

1.1

Vacunación de los niños y niñas menores de 5 años: esquema sugerido por la SCP

Vacuna		Nacimiento	2 meses	4 meses	6 meses	7 meses	9 meses	12 meses	18 meses	4 años	5 años
BCG		X									
Hepatitis B		X									
Rotavirus (RV1)			X	X							
Hexavalente (DTaP, Hib, HB, IPV) ^a <small>(DTaP: Difteria, Tétanos y Pertussis acelular)</small>			X	X	X				X ^b		
Neumococo	PCV13		X	X				X			
	PCV15		X	X				X			
	PCV20		X	X				X			
Influenza (Tetravalente o trivalente)					X	X		X ^d	Vacunación anual a lo largo de la vida		
Varicela								X ^e			X
Hepatitis A								X ^f			
SRP								X ^{e1}	X		
Fiebre amarilla ^g									X		
DPT											X ^h
SARS-CoV-2					X ⁱ						
Meningococo Conjugada Tetravalente (MenACWY) ^j	Nimenrix ^k		X	X				X			
	Menveo ^l		X	X				X			
	Menactra ^m						X	X			
	Menquadri ⁿ							X			
Meningococo B ⁿ	Bexsero ^o		X	X				X			
Anticuerpos monoclonales contra VRS	Nirsevimab ^o	X									
Dengue ^p										X	

- a. Reemplaza la pentavalente y la IPV del PAI.
- b. El refuerzo de hexavalente a los 18 meses podría ser reemplazado por una pentavalente acelular. (DPaT)
- c. Opcional: esquema 3+1 (2,4,6 meses y refuerzo a los 12), especialmente en pacientes con factores de riesgo.
- d. Dosis anual a lo largo de la vida.
- e. Se puede aplicar vacuna combinada SRP + varicela.
- e1. Se puede aplicar vacuna combinada SRP + varicela a los 12 y 18 meses. En este caso, se omite la dosis de varicela a los 5 años.
- f. Se puede considerar refuerzo a los 6 meses de la primera dosis.
- g. Se puede indicar a los 9 meses (Stamaril), y en zonas endémicas o de acuerdo a factores de riesgo, se puede aplicar a los 6 meses, previa prescripción médica. No indicada por debajo de los 6 meses.
- h. Opción alternativa: DTaP.
- i. La dosificación varía según la vacuna disponible; la edad recomendada de inicio de vacunación es desde los 6 meses con vacunas de ARNm. Se recomiendan refuerzos con vacunas actualizadas según epidemiología.
- j. Se puede utilizar cualquiera de las tres vacunas. La dosificación varía según la edad de inicio.
- k. Se puede aplicar desde las 6 semanas.
- l. Esquema alternativo a los 2, 4 y 12 meses.
- m. La edad mínima de inicio de vacunación es 12 meses. Aplicación de dosis única. Dosis de refuerzo en mayores de 12 años si persiste el riesgo de enfermedad por meningococo.
- n. Las dosis varían según la edad de primovacunación.
- o. Ver anexo.
- p. Esquema de dos dosis a partir de los 4 años.

Vacunas alternativas, no incluidas en el PAI

Rotavirus (RV5)	2, 4 y 6 meses
Pentavalente acelular (Hib, DTaP, IPV)	2, 4 y 6 meses (refuerzo a los 18 meses)
Sarampión, paperas, rubeola y varicela (SPRV)	12 meses
Hepatitis A y Hepatitis B	12 meses