

2

Vacunación del escolar y adolescente sano: PAI Colombia

Vacuna	6 años	9 años	10 años	11 años	15 años	18 años
VPH ^a (Virus del Papiloma Humano)		X				
Td niñas (Tétanos, difteria)			X			
SARS-CoV-2 ^b						

2.1

Vacunación del escolar y adolescente sano: esquema sugerido por la SCP

Vacuna	6 años	9 años	10 años	11 años	12-15 años	16 años
Influenza (Tetraivalente o trivalente) ^c						
Tdap ^d				X		
VPH ^a	Tetraivalente	X				
	Nonavalente	X				
SARS-CoV-2 ^b						
Meningococo Conjugada Tetraivalente (MenACYW) ^e	Ver dosis (anexo 1), según antecedente de inmunización con vacunas tetraconjugadas y/o factores de riesgo.					
Hepatitis A						
Hepatitis B						
Varicela						
SRP						
Meningococo B Bexsero ^g			X ^f			
Dengue ^g TAK-003	X					

Incluida en el PAI

Vacuna complementaria, no incluida en el PAI

Si no tiene esquema infantil completo
(ver anexo para definir número de dosis).

Cuando se encuentre disponible

a. A partir del 1 de octubre de 2023, se anunció la dosis única de VPH género neutro (niños y niñas). Sin embargo, se recomienda a nivel individual dos dosis, y tres si tiene factores de riesgo. Ver anexo 1.

b. La dosificación varía según la vacuna disponible; la edad recomendada de inicio de vacunación es desde los 6 meses con vacunas de ARNm. Se recomiendan refuerzos con vacunas actualizadas según epidemiología.

c. Se recomienda vacunación anual durante todo el curso de la vida.

d. Niños y niñas.

e. Ver dosis (anexo 1), según antecedente de inmunización con vacunas tetraconjugadas y/o factores de riesgo.

f. Ver anexo para indicación de refuerzos.

g. La vacuna es recomendada a partir de los 4 años en un esquema de dos dosis, con un intervalo de tres meses.