

Recomendaciones sobre inmunizaciones:

Incluyen PAI (Programa Ampliado de Inmunizaciones) y vacunas complementarias
Comité de Vacunas – Sociedad Colombiana de Pediatría

1

Vacunación de los niños y niñas menores de 5 años: PAI Colombia

Vacuna	Nacimiento	2 meses	4 meses	6 meses	7 meses	12 meses	18 meses	5 años
BCG <i>(Bacillus Calmette-Guerin)</i>	X							
Hepatitis B	X							
Rotavirus (RV1)		X	X					
Pentavalente (DPT, Hib, HB) <i>(Difteria, Pertussis, Tétanos) (Haemophilus influenzae B) (Hepatitis B)</i>		X	X	X			X	
IPV <i>(Vacuna polio inactivada)</i>		X	X	X			X	X ^a
Neumococo PCV13		X	X			X		
Influenza (Trivalente)				X	X	X ^b		
Varicela						X		X
Hepatitis A						X		
SRP <i>(Sarampión, Rubéola, Paperas)</i>						X	X	
Fiebre amarilla							X	
DPT								X
SARS-CoV-2 ^c								

a. A partir del 1 de octubre de 2023 todas las dosis son de polio parenteral.

b. Segunda dosis de influenza en el segundo año de vida.

c. La dosificación varía según la vacuna disponible; la edad recomendada de inicio de vacunación es desde los 6 meses con vacunas de ARNm. Se recomiendan refuerzos con vacunas actualizadas según epidemiología.