

# 1.2

## Vacunación de los niños y niñas menores de 5 años: esquema sugerido por la SCP

Vacuna	Nacimiento	2 meses	4 meses	6 meses	7 meses	9 meses	12 meses	18 meses	5 años
BCG	X								
Hepatitis B	X								
Rotavirus (RV1)		X	X						
Hexavalente (DTaP, Hib, HB, IPV) <sup>a</sup>		X	X	X				X <sup>b</sup>	
Neumococo PCV13		X	X				X		
Influenza (Tetravalente)				X	X		X <sup>c</sup>		
Varicela							X <sup>d</sup>		X
Hepatitis A							X <sup>e</sup>		
SRP							X <sup>d1</sup>	X	
Fiebre amarilla								X	
DPT									X
SARS-CoV-2				X <sup>f</sup>					
Meningococo Conjugada Tetravalente (MenACYW) <sup>g</sup>	Nimenrix <sup>h</sup>	X	X				X		
	Menveo <sup>i</sup>	X	X	X			X		
	Menactra <sup>g</sup>					X	X		
Meningococo B	Bexsero <sup>g</sup>	X	X				X		

Vacuna Incluida en el PAI

Vacuna complementaria, no incluida en el PAI

Cuando se encuentre disponible

- a. Reemplaza la pentavalente y la IPV del PAI.
- b. El refuerzo de hexavalente a los 18 meses podría ser reemplazado por una pentavalente acelular.
- c. Dosis anual a lo largo de la vida.
- d. Se puede aplicar vacuna combinada SRP + varicela.
- d1. Se puede aplicar vacuna combinada SRP + varicela a los 12 y 18 meses. En este caso, se omite la dosis de varicela a los 5 años.
- e. Se puede considerar refuerzo a los 6 meses de la primera dosis.
- f. La dosificación varía según la vacuna disponible; la edad recomendada de inicio de vacunación es desde los 6 meses con vacunas de ARNm.
- g. Se puede utilizar cualquiera de las tres vacunas. La dosificación varía según la edad de inicio.
- h. Se puede aplicar desde las 6 semanas.
- i. Esquema alternativo a los 2, 4 y 12 meses.

### Presentaciones alternativas de vacunas, no incluidas en el PAI

Rotavirus (RV5)	2, 4 y 6 meses
Pentavalente acelular (Hib, DPT, IPV)	2, 4 y 6 meses (refuerzo a los 18 meses)
Sarampión, paperas, rubeola y varicela (SPRV)	12 meses
Hepatitis A y Hepatitis B	12 meses