

6

Vacunación en el postrasplante de médula ósea

Meses desde el trasplante de médula ósea

Vacunas		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	24
Influenza	VI						1 dosis anual							
Neumococo PCV13 ^a	VI			3 dosis										
Vacuna antineumocócica polisacárida 23-valente (PPSV23)										1 dosis				
DPT ^b	VI									3 dosis				
<i>H. influenzae</i> tipo b ^b	VI									3 dosis				
Polio inactivado ^b	VI									3 dosis				
Hepatitis B recombinante ^b	VI									3 dosis				
Triple viral SRP ^c	VVA													2 dosis
Varicela ^c	VVA													2 dosis
Meningococo conjugada (ACYW)	VI									2 dosis				
Virus del Papiloma Humano (VPH) ^d										3 dosis				
Meningococo B													2 dosis	

VI: vacuna inactivada, **VVA:** vacuna viva atenuada

- a. 3 dosis con un mes de diferencia. En caso de EICH, una cuarta dosis a los 3 meses por trasplante.
- b. 6 meses posteriores a la última dosis de PCV-13 ó 9-12 meses postrasplante, y 3 dosis de una vacuna combinada hexavalente (acelular) a partir de los seis meses posteriores al trasplante.
- c. Se recomienda solo en pacientes seronegativos sin EICH (enfermedad injerto contra huesped), sin inmunosupresores, sin recaída de la enfermedad subyacente y sin administración reciente de inmunoglobulinas (8 - 11 meses previos).
- d. 6 - 12 meses después del trasplante. A los 0, 1 y 6 meses entre dosis.